

COMMUNICATIONS.

NOUVEAUX CLYTINI DE CHINE (COL. LONGICORNES),

PAR M. MAURICE PIC,
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les Longicornes du groupe des *Clytini* faisant l'objet du présent article proviennent des récoltes de feu l'abbé David en Chine et font partie des Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

***Xylotrechus bifenestratus* n. sp.**

Parum elongatus, postice subattenuatus (antennis pedibusque, femoribus posticis pro parte nigris exceptis, testaceis), niger, capite antice, elytris ad basin apiceque rufescentibus, luteo pubescens, thorace signaturis nigris bifenestratis ornato, elytris nigro quadri fasciatis.

Peu allongé, faiblement atténué postérieurement (membres, moins le sommet des cuisses postérieures foncé, testacés), noir avec le devant de la tête, la base et le sommet des élytres roussâtres, revêtu d'une pubescence jaune avec des dessins noirs sur le prothorax (ceux-ci renfermant deux macules jaunes juxtaposées en arrière du disque) et 4 fascies sur les élytres également noires. Tête moins large que le prothorax, unicarénée sur le front; antennes courtes, subfiliformes, ciliées en dessous, prothorax subglobuleux, étranglé devant la base, un peu moins large que les élytres; élytres assez courts, peu atténués à l'extrémité, tronqués au sommet avec l'angle externe un peu marqué, ornés sur chacun des dessins noirs suivants: une fascie raccourcie près de la base, arquée en avant avec, un peu en dessous de celle-ci, une 2^e fascie complète, circonflexe, deux fascies transversales, en dessous du milieu et avant le sommet, celles-ci jointes sur la suture et sur les côtés; pattes postérieures longues, fémurs plus longs que les élytres; dessous antérieurement noir, maculé de jaune, abdomen jaune à sommet des segments foncé et glabre. Long. 12 mill.

Chine: Nord de Pékin, 1865 (A. David).

Voisin de *X. diversesignatus* Pic, forme analogue, dessins noirs du prothorax semblables, mais fascies élytrales plus larges et différentes, les médianes n'étant pas jointes sur leur milieu et cuisses postérieures en partie foncées.

Clytus magnificus n. sp.

Robustus, subparalellus, niger, pro parte luteo pubescens, thorace nigro, luteo cincto, elytris nigris, luteo cinctis, apice luteo maculatis, ad et post medium transverse luteo bifasciatis; antennis pedibusque nigris.

Robuste, subparallèle, noir membres compris, orné en partie d'une pubescence jaune, celle-ci condensée par places avec le pourtour du prothorax et celui des élytres étroitement bordés de jaune, élytres ayant, en outre, le sommet et deux fascies transversales jaunes. Tête bien plus étroite que le prothorax, densément ponctuée; antennes courtes et assez robustes; prothorax robuste, subglobuleux, densément ponctué, presque de la largeur des élytres; écusson pubescent de jaune; élytres assez longs, peu atténués à l'extrémité, subtronqués en dedans au sommet, ayant chacun, en outre d'une étroite bordure et du sommet largement jaunes, deux fascies transversales de même pubescence, la 1^{re} antérieure, remontant vers l'écusson et sur les côtés, la 2^e transversale, un peu arquée, placée en dessous du milieu; cuisses postérieures ne dépassant pas les élytres; abdomen jaune, le reste du dessous du corps foncé et maculé de jaune. Long. 22 mill.

Chine : Mou Pin, 1870 (A. David).

Cette belle espèce se distingue, à première vue, de *C. validus* Frm. par la disposition des bandes des élytres et par la forme de ces organes moins rétrécie à l'extrémité.

Demonax inhumeralis n. sp.

Parum elongatus, pro parte griseo pubescens, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, niger, elytris apice griseo notatis, ante et post medium griseo bifasciatis, fascia prima circumflexa, infra corpore albo notato.

Peu allongé, en partie pubescent de gris, membres en partie rous-sâtres, noir avec le sommet des élytres pubescent de gris et deux fascies grises, dessous maculé de blanc. Tête un peu moins large que le prothorax; antennes assez longues, à articles 3 et 5 faiblement épineux au sommet; prothorax subglobuleux, un peu plus étroit que les élytres, bordé de blanc sur les côtés de la base; écusson pubescent de blanc; élytres assez courts, un peu rétrécis à l'extrémité, tronqués au sommet, avec l'angle externe un peu épineux, dépourvus de macule humérale blanche, à fond noir ayant des reflets fauves avec le sommet assez largement marqué de blanc et deux fascies de pubescence blanche, la première étroite, circonflexe, remontant vers l'écusson, la deuxième transversale,

placée en dessous du milieu ; poitrine et côtés antérieurs du dessous marqués de blanc et 1^{er} segment de l'abdomen largement bordé de blanc ; cuisses postérieures dépassant les élytres, 1^{er} article des tarsi long. Long. 11 mill.

Chine : Mou Pin, 1870 (A. David)⁽¹⁾.

Voisin de *D. acanthocerus* Gglb. dont il semble différer par la forme moins allongée et le 2^{me} segment de l'abdomen non bordé de blanc.

⁽¹⁾ En outre de l'exemplaire du Muséum, j'ai étudié, pour rédiger cette description, un deuxième spécimen faisant partie de ma collection.